

毒蛇咬傷 衛生保健組關心您

四月至十月毒蛇出沒，儘量避免走進長草區，否則應換穿長統靴或長統雨鞋，手拿木棍撥弄草叢，把蛇嚇退。萬一不小心遭蛇咬傷，最好把蛇打死帶至醫院辨別毒液性質以幫助治療，或者以蛇體頭部、身體環節形狀或特徵來判定是否為毒蛇。

※急救箱：本校大門口警衛隊（分機：13710 專線：2721034）。

衛生保健組（分機：12345 專線：2721214）。

※嘉義縣市提供毒蛇血清之醫療院所：

醫院名稱	電話
行政院衛生署嘉義醫院	05-3109090 轉急診室
嘉義榮民醫院	05-2359630 轉急診室
聖馬爾定醫院	05-2756000 轉急診室
嘉義基督教醫院	05-2765041 轉急診室
華濟醫院	05-2378111 轉急診室
大林慈濟醫院	05-2648000 轉急診室
行政院衛生署朴子醫院	05-3790600 轉急診室
灣橋榮民醫院	05-2791072 轉急診室
嘉義縣衛生局	05-3620600 轉一課
嘉義市衛生局	05-2338066 轉一課

※抗毒血清之使用：

台灣抗蛇毒血清全由預防醫學研究所生產及發售，目前市面上有三種抗蛇毒血清製品出售。1 出血性抗蛇毒血清：可對抗龜殼花及青竹絲咬傷。2 神經性抗蛇毒血清：可對抗雨傘節及眼鏡蛇咬傷。3 抗百步蛇血清：可對抗百步蛇咬傷。

抗毒血清使用前須先作過敏試驗，30 分鐘內局部產生輪狀浮腫，且周圍起紅暈者，視為陽性，否則為陰性。

抗毒血清的用法一般可加在點滴液中稀釋（需醫師處方），在 15-30 分鐘內注射完畢；注射時間勿超過 2 小時。如患者皮膚試驗為陽性反應，且確實需抗毒血清之治療，可以先行注射抗過敏藥劑及 decadron，並減慢注射速度至 30 分鐘至 2 小時；同時準備急救設備與 epinephrine 在旁，以便發生過敏性休克時可急救。抗毒血清一般在咬傷後 4 小時內注射最有效，超過 8 小時才注射效果較差。十歲以下小孩之注射量為成人劑量依體重加倍使用（即約每公斤體重 40U）。